

03 Biostimolanti
3.1. Aminoacidi



vegenergy®

CONCIME ORGANO AZOTATO DI **ORIGINE VEGETALE**

EFFICIENTE BIOSTIMOLANTE ANTISTRESS CON MASSIMA CONCENTRAZIONE DI AMINOACIDI LIBERI


Presentazione: Soluzione Liquida (SL)

Densità: 1,12

pH: 4,6

PACKAGING DISPONIBILE

TANICHE



SPECIFICHE TECNICHE

Aminoacidi totali 26% p/p (290 g/l)

Aminoacidi liberi: 23% p/p (257 g/l)

Azoto organico: 4,6% p/p (52 g/l)

Carbonio (C) organico di origine biologica: 12% p/p (134 g/l)

Materie prime: 100% matrici vegetali selezionate

PRINCIPALI BENEFICI

- Elevato apporto di aminoacidi vegetali essenziali
- Biostimolante naturale della fisiologia della pianta in condizioni normali e critiche per lo sviluppo
- Apporto di energia prontamente assimilabile
- Particolarmente indicato durante i periodi critici della coltura (trapianto, prefioritura, maturazione, ecc.)



Utilizzabile in agricoltura biologica
secondo il regolamento
CE No. 834/2007 e 889/2008



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

DOSI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

FERTIRRIGAZIONE

Dose generale

3-5 L/ha

All'inizio e durante lo sviluppo vegetativo ogni 10-14 giorni, a seconda delle esigenze della coltura.

APPLICAZIONE FOGLIARE

Dose generale

1-3 L/ha

Ripetendo il trattamento non prima di 10-15 giorni. Si consiglia di non trattare durante la fioritura. Per maggiore efficacia, trattare su vegetazione asciutta con un adeguato volume di acqua per ottenere una sufficiente bagnatura fogliare. Assicurarsi 3-4 ore di assenza di piogge dopo il trattamento per favorire una penetrazione ottimale.

Frutticole, vite, fragola

2 L/ha

All'inizio della ripresa vegetativa, o quando necessario durante il ciclo vegetativo

Agrumi e olivo

3 L/ha

3 interventi durante la fase di pre-fioritura ed allegagione

Colture estensive

1-2 L/ha

In abbinamento ai diserbi

Orticole a frutto e bulbo

2 L/ha

Applicare all'inizio del ciclo vegetativo o a seconda dell'esigenza.

Orticole a foglia

1-2 L/ha

Applicare all'inizio del ciclo vegetativo o a seconda dell'esigenza.

Ornamentali

2-3 L/ha

Applicare all'inizio del ciclo vegetativo