




# twintech Zn+Mn

MISCELA DI MICROELEMENTI

RIMEDIO FOGLIARE PER LE APPLICAZIONI DI ZINCO E MANGANESE

**Presentazione:** Soluzione Liquida (SL)**Densità:** 1,4**pH:** 4,0**PACKAGING DISPONIBILE**

TANICHE

**SPECIFICHE TECNICHE**

Zinco (Zn) solubile in acqua: 7,1% p/p (99,4 g/l)

Manganese (Mn) solubile in acqua: 5,1% p/p (71,4 g/l)

Rame (Cu) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,03% p/p (0,4 g/l)

Boro (B) solubile in acqua: 0,024% p/p (0,3 g/l)

Molibdeno (Mo) solubile in acqua: 0,003% p/p (0,04 g/l)

Magnesio (MgO): 0,2% p/p (2,8 g/l)

**PRINCIPALI BENEFICI**

- Efficiente prevenzione e correzione delle carenze di zinco e manganese
- Massima efficienza per quanto riguarda i più frequenti disordini fisiologici causati dalla mancanza di questi due micronutrienti
- Speciale formulazione di Tradecorp per favorire il massimo assorbimento di Zn e Mn dalle foglie e il loro trasporto all'interno della pianta
- Arricchito con boro, molibdeno, magnesio e rame chelato con EDTA per spingere i processi metabolici delle piante

**CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA****DOSI E MODALITA' DI APPLICAZIONE****APPLICAZIONE FOGLIARE**

Agrumi	250-400 cc/hl	Applicare durante il germogliamento primaverile-estivo e l'allegagione dei frutti. Non trattare durante la fioritura e dopo che i frutti cambiano colore
Alberi da frutto e olivi	3-4 L/ha (250-400 cc/hl)	Applicare durante l'ingrossamento frutti e l'inizio caduta petali
Viti	3-4 L/ha (250-400 cc/hl)	2 applicazioni. Applicare durante la fase con grappoli visibili e alla chiusura del grappolo
Pomodoro, melanzana, peperone, fragola, cetriolo e cucurbitacee	2-4 L/ha	Applicare quando il raccolto ha 4-6 foglie. Ripetere il trattamento ogni volta che è necessario con intervallo di 10-15 giorni
Mais	2-3 L/ha	Applicare durante le prime fasi di crescita, in abbinamento al diserbo
Cereali	2 L/ha	Applicare alla levata
Cavolo, cavolfiore, broccoli	3 L/ha	Applicare in fase 4-6 foglie. Ripetere il trattamento ogni volta che è necessario
Soia, fagioli, piselli	2-3 L/ha	Applicare in fase 4-6 foglie
Patata	2-3 L/ha	2 applicazioni. Applicare quando il prodotto raggiunge 15 cm e 15 giorni più tardi
Aglione, cipolla	3 L/ha	Applicare in fase 4-6 foglie. Ripetere il trattamento ogni volta che è necessario
In miscela con altri prodotti, non applicare con soluzioni inferiori pH 4,5		

**APPLICAZIONE AL SUOLO**

Tutte le colture	4-10 L/ha	Applicare 2 - 4 volte a seconda delle esigenze di sviluppo e della coltura
------------------	-----------	--